

**Vous êtes atteint de fibrose pulmonaire ou autre pneumopathie interstitielle diffuse,
Etes-vous bien protégé ?**

Pour vous et votre entourage, à l'automne

- Vaccination COVID-19
1 dose du vaccin le mieux adapté à l'épidémiologie, au 1/09/2024: utilisation préférentielle vaccin monovalent COMIRNATY® Omicron XBB.1.5
A partir de 6 mois après la dernière injection ou infection COVID
Délai réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées
Quel que soit le nombre de doses réalisées auparavant

- Vaccination grippe
Avec le vaccin dose standard, seul vaccin disponible cette saison 2024-2025.

La réalisation concomitante des vaccins grippe et COVID-19 est possible. Les 2 injections peuvent être pratiquées le même jour, mais sur 2 sites de vaccination distincts – un vaccin dans chaque bras. Si non faits simultanément, il n'y a pas de délai à respecter entre les 2 vaccinations.

Pour vous

- Vaccination pneumocoque
Vaccin conjugué 20-valent (PREVENAR20®) 1 injection
Respecter un délai d'1 an après l'administration d'un PREVENAR13® ou PNEUMOVAX® et un délai de 5 ans après l'administration d'un schéma complet associant PREVENAR13® puis PNEUMOVAX®

- Vaccination contre le Virus Respiratoire Syncytial (VRS)
Si vous avez 65 ans ou plus : vaccin AREXVY® ou ABRYVVO® 1 injection,
Modalités de remboursement en attente
Non recommandé si vous avez moins de 65 ans

- Vaccination coqueluche associée aux valences diphtérie-tétanos-polio
Recommandée à 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans (REPEVAX® ou BOOSTRIXtetra®)

- Vaccination zona
A partir de 65 ans (ou dès 18 ans si traitement immunosuppresseur) par le vaccin SHINGRIX®
2 injections espacées de 2 mois, disponible en pharmacie hospitalière au titre de l'accès direct (en attente de remboursement en pharmacie d'officine)



Société de Pneumologie de Langue Française

