

Vous êtes atteint de fibrose pulmonaire ou autre pneumopathie interstitielle diffuse,

Etes-vous bien protégé ?

Pour vous et votre entourage, à l'automne

- Vaccination COVID-19
1 dose du vaccin le mieux adapté à l'épidémiologie (LP.8.1), vaccin COMIRNATY®
A partir de 6 mois après la dernière injection ou infection COVID
Délai réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées ou de 80 ans et plus
Quel que soit le nombre de doses réalisées auparavant
- Vaccination grippe
Avec le vaccin dose standard
Ou préférentiellement à partir de 65 ans avec le vaccin haute dose EFLUELDA® ou avec adjuvant FLUAD®

La réalisation concomitante des vaccins grippe et COVID-19 est possible. Les 2 injections peuvent être pratiquées le même jour, mais sur 2 sites de vaccination distincts – un vaccin dans chaque bras. Si non faits simultanément, il n'y a pas de délai à respecter entre les 2 vaccinations.

Pour vous

- Vaccination pneumocoque
Vaccin conjugué 20-valent (PREVENAR20®) 1 injection
Respecter un délai d'1 an après l'administration d'un PREVENAR13® ou PNEUMOVAX®
- Vaccination contre le Virus Respiratoire Syncytial (VRS)
Si vous avez 65 ans ou plus : vaccin AREXVY® ou ABRYSVO® 1 injection,
Modalités de remboursement en attente (coût autour de 200 €)
Non recommandé si vous avez moins de 65 ans
- Vaccination coqueluche associée aux valences diphtérie-tétanos-polio
Recommandée à 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans (REPEVAX® ou BOOSTRIXtetra®)
- Vaccination zona
A partir de 65 ans (ou dès 18 ans si traitement immunosuppresseur) par le vaccin SHINGRIX®
2 injections espacées de 2 mois, disponible en pharmacie hospitalière au titre de l'accès direct (en attente de remboursement en pharmacie d'officine)



OrphaLung
Centre de Référence
Maladies Pulmonaires Rares



Société de Pneumologie de Langue Française

